


BERREA 2007



CIERVO

Cervus elaphus hispanicus


- Es una de las especies de caza mayor que más atractivo supone para los cazadores por el trofeo.



CIERVO

Cervus elaphus hispanicus


- Se considera que en la Península Ibérica el Ciervo que existe pertenece a la subespecie hispanicus, el cual se caracteriza por ser de menor tamaño, tener una cuerna más cerrada y carecer de melena en el pecho.



CIERVO

Cervus elaphus hispanicus


- En los años 50 la distribución del Ciervo en la Península Ibérica quedó reducida a Doñana, zonas de Sierra Morena, a pequeñas zonas de Montes de Toledo, y a Sierra de San Pedro (Extremadura).



CIERVO

Cervus elaphus hispanicus

- Pero en el año 52, el Servicio de Pesca Continental y Caza (antecesor del ICONA) llevó a cabo la reintroducción de esta especie a partir de ejemplares procedentes de Lugar Nuevo (Jaén) y Quintos de Mora (Toledo).





CIERVO


Cervus elaphus hispanicus

- El ciclo biológico del Ciervo comienza en Mayo-Junio que es cuando se producen los partos, y las crías serán Gabatos hasta aproximadamente otoño.

CIERVO

Cervus elaphus hispanicus

- Después, los machos comenzarán a desarrollar el primer indicio de cuerna que recibe el nombre de varas, por lo que a esos Ciervos se les llama Varetos. Las varas estarán recubiertas por el terciopelo mientras el cartílago que las forma va tomando consistencia ósea. La eliminación de ese terciopelo, a lo que se llama Descorreado, la realizarán a partir de Agosto.



CIERVO

Cervus elaphus hispanicus

- Algunos Varetos de muy buena calidad pueden presentar, además de las dos varas, una punta más, en este caso reciben el nombre de Horquillones. Tanto la cuerna de los Varetos como de los Horquillones se caracteriza por carecer de Roseta en su base.



CIERVO

Cervus elaphus hispanicus


- La caída de la cuerna o Desmogue suele ser en Marzo, aunque en individuos viejos se adelanta a Febrero, y en jóvenes puede ser incluso en Abril. Posteriormente, empiezan a desarrollar la nueva cuerna que se encontrará completa aproximadamente en Julio, y por tanto, procederá al Descorreado; apareciendo la cuerna blanca o del color que le haya transmitido la savia de los árboles o arbustos contra los que se quite el terciopelo.



CIERVO

Cervus elaphus hispanicus

- En Septiembre-Octubre tiene lugar el celo, que en el caso del Ciervo recibe el nombre de berrea.



CIERVO

Cervus elaphus hispanicus

- Se puede decir que los Ciervos a partir de 2,5 años ya tienen un número de puntas suficientes para ser cazado, pero la calidad del trofeo es muy baja. La cuerna en los machos continúa desarrollándose hasta los 7,5 años, aunque seguirá creciendo en grosor, longitud y número de puntas hasta los 10 años, pero a partir de este momento comenzará a degenerar.

A silhouette of a deer with large antlers stands in a field of tall grass at sunset. The sky is a warm orange, and the deer is positioned in the center-left of the frame. The text is overlaid on the top left of the image.

CIERVO

Cervus elaphus hispanicus

- Factores genéticos.



CIERVO

Cervus elaphus hispanicus

- La densidad de individuos: A baja densidad los animales no van a tener problema de alimentación, sobre todo en momentos críticos como es el verano y el otoño.

CIERVO

Cervus elaphus hispanicus

- Calidad de la madre: Influye en que ella produzca una cantidad de leche adecuada, y por tanto, en que el gabato tenga un peso adecuado.



CIERVO

Cervus elaphus hispanicus

- Alimento que tenga durante el primer año de vida: No sólo de leche, sino también de herbáceas, frutos y hojas de árboles y arbustos.



CIERVO

Cervus elaphus hispanicus

- Las puntas de la cuerna reciben distintos nombres, desde la base donde se encuentra la Roseta hacia la parte más superior son:






CIERVO

Cervus elaphus hispanicus

- El Ciervo es un animal bastante adaptable, sobre todo vive en bosques o matorrales caducifolios, excepto de resináceas.



CIERVO

Cervus elaphus hispanicus

- La densidad idónea de Ciervos es de 1 individuo por cada 3 hectáreas, de las cuales 2 hectáreas serían de matorral y 1 hectárea de pasto; considerando un matorral de cierta calidad. Además debe existir un buen grado de intercalación entre matorral y pasto.



CIERVO

Cervus elaphus hispanicus

- Las hembras forman grupos familiares que ocupan una determinada zona de pasto. Si se elimina a la cierva vieja, probablemente el grupo se disgregue y vaya a zonas peores; ya que aunque esa hembra ya no pare, posee más experiencia y conoce mejor las zonas de alimento, cómo evitar a los depredadores, etc.